

# 您被診斷出患有幽門螺旋桿菌 (H. pylori)。現在怎麼辦？



## 擺脫幽門螺旋桿菌—原因和方法

### 幽門螺旋桿菌是什麼？它有危險嗎？

幽門螺旋桿菌是一種可引起胃部感染的細菌。幽門螺旋桿菌會刺激胃粘膜，導致多種症狀，包括胃痛和噁心。如果不及時治療，感染幽門螺旋桿菌會導致胃潰瘍，這是一種痛苦的胃壁開放性潰瘍，會導致出血。研究也顯示，感染幽門螺旋桿菌的人更有可能發展成胃癌。清除胃裡的幽門螺旋桿菌可降低患胃病、胃潰瘍和胃癌的風險。

### Talicia是什麼？

如果您的醫生給您開立Talicia，就表示您已感染幽門螺旋桿菌。Talicia用來治療成人的幽門螺旋桿菌感染。它是由三種藥物組成的膠囊。Talicia含有兩種抗生素和一種藥物，可減少胃酸，使抗生素更容易殺死幽門螺旋桿菌。

### 我該如何服用Talicia？

每8小時4顆膠囊，與食物共服，持續14天。膠囊應該整顆吞服。請勿咀嚼或壓碎，也不要與酒精共服。

如果您錯過一劑，請儘快服用。當您發現錯過一劑但到了服用下一劑的時間，請按時服用下一劑。請勿服用雙倍劑量來彌補漏服劑量。

### 為什麼按照指示服完Talicia很重要？

在14天結束之前，您可能會感到好轉。然而，幽門螺旋桿菌是一種非常頑固的細菌，如果未從胃裡徹底清除，仍然可以存活。

您應在整整14天裡嚴格按照指示服用Talicia。跳過劑量或未完成治療可能無法從胃裡清除幽門螺旋桿菌，而且將來可能會增加抗生素的耐藥性。服完Talicia之後，您也應該向醫護人員後續追蹤，完成他們建議的任何檢測。

完整處方資訊及重要的患者安全資訊請見背面。

**Talicia**<sup>®</sup>  
(omeprazole magnesium,  
amoxicillin, and rifabutin)  
delayed-release capsules

## 重要的患者安全資訊

開始服用Talicia之前，請告訴醫護人員您服用的所有藥物，包括處方和非處方藥物、維他命和草藥補充劑。Talicia可能會影響其他藥物的作用方式，其他藥物也會影響Talicia的作用方式。服用Talicia期間，如果未事先與您的醫護人員洽談，請勿開始服用任何新的藥物。

- 如果您已知會對Talicia的任何成分 (omeprazole、amoxicillin、rifabutin)、青黴素、質子泵抑制劑或rifamycins過敏，則不應服用Talicia。
- 如果您正在服用含rilpivirine的產品、delavirdine或voriconazole，也不應服用Talicia。



在服用Talicia之前，請告訴醫護人員有關您所有的醫學狀況，包括您是否：

- 懷孕中或打算受孕。Talicia可能會對未出生的嬰兒造成傷害。如果您在治療期間懷孕，或是您認為可能懷孕，請告知您的醫護人員。
- 有嚴重的腎病或肝病。

服用Talicia時，請勿碾碎或咀嚼膠囊。請勿與酒精共服Talicia。

如果您在服用Talicia時出現以下情況，請立刻打電話給醫護提供者：

- 新發皮疹或其他皮膚變化、肌肉或關節疼痛、身體任何部位腫脹、嚴重流感樣症狀、呼吸困難、發燒、尿中帶血、排尿增多或減少、嗜睡、神志不清、噁心、嘔吐、持續胃痛、出血性腹瀉，或在治療結束後持續腹瀉、體重增加或視力改變。

Talicia最常見的副作用是什麼？

- Talicia最常見的副作用是腹瀉、頭痛、噁心、胃痛、皮疹、消化不良、口腔或咽喉痛、嘔吐和陰道酵母菌感染。請致電向您的保健專業人員請教有關副作用的醫療建議。
- 如果您在深呼吸時感到疲倦、無力、疼痛、頭痛、頭暈、憂鬱症、對光的敏感性增加或痛苦，請告訴您的醫護人員。
- Talicia可能會降低口服或其他激素避孕法的效果。服用Talicia時，您應使用其他非激素的高效避孕法。
- 服用Talicia時，您的尿液或眼淚可能會變成棕橙色。

此處提供的資訊並不全面。請瀏覽[www.talicia.com](http://www.talicia.com)獲取處方資訊。

您可以致電1-800-FDA-1088或上網[www.fda.gov/medwatch](http://www.fda.gov/medwatch)向FDA報告副作用