

У вас диагностировали *Helicobacter pylori* (*H. pylori*). Что теперь делать?



Избавляемся от *H. pylori*—для чего и каким образом

Что такое *H. pylori*? Представляет ли это опасность?

H. pylori является бактерией, которая может вызвать инфекцию в желудке. *H. pylori* может раздражать слизистую желудка и вызывать различные симптомы, включая боль в животе и тошноту.

При отсутствии лечения инфекция, вызванная *H. pylori*, может приводить к язвам, представляющим собой открытые болезненные раны на слизистой желудка, которые могут кровоточить. Исследования также показали, что у лиц, инфицированных *H. pylori*, более высока вероятность развития рака желудка. Устранение *H. pylori* из желудка может снизить риск развития раздражения, язв и рака желудка.

Что представляет собой препарат Talicia?

Если ваш врач назначил вам препарат Talicia, это означает, что у вас была диагностирована инфекция, вызванная *H. pylori*. Препарат Talicia предназначен для лечения инфекции, вызванной *H. pylori*, у взрослых. Препарат состоит из трех лекарственных средств, объединенных в одной капсуле. Препарат Talicia включает в себя 2 антибиотика, а также лекарственное средство, которое снижает кислотность желудка и облегчает задачу антибиотиков по уничтожению бактерий *H. pylori*.

Как принимать препарат Talicia?

Следует принимать 4 капсулы препарата Talicia с пищей каждые 8 часов в течение 14 дней. Капсулы следует проглатывать целиком. Нельзя разжевывать или измельчать капсулы, а также принимать препарат Talicia с алкоголем.

Если вы пропустили прием, следует принять дозу препарата как можно быстрее. Если перед приемом следующей дозы препарата вы вспомнили, что пропустили предыдущий прием, примите дозу в назначенное время. Нельзя принимать две дозы препарата за один раз, чтобы восполнить пропущенный прием.

Почему важно завершить прием препарата Talicia в соответствии с назначением?

Еще до завершения 14 дней ваше состояние может улучшиться. Тем не менее, *H. pylori* является очень устойчивой бактерией, которая может остаться в желудке, если ее полностью не устранить.

Необходимо принимать препарат Talicia строго в соответствии с назначением все 14 дней. Пропуск приема препарата или незавершенное лечение могут привести к тому, что *H. pylori* может остаться в желудке, при этом увеличивается вероятность развития устойчивости к антибиотикам в будущем. Вы также должны выполнять все указания своего лечащего врача и пройти все рекомендуемые анализы после завершения лечения препаратом Talicia.

См. полную инструкцию по применению препарата и ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПАЦИЕНТА на обороте.

**Talicia**[®]
(omeprazole magnesium,
amoxicillin, and rifabutin)
delayed-release capsules

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

Сообщите своему лечащему врачу обо всех лекарственных препаратах, которые вы принимаете, включая рецептурные и безрецептурные препараты, а также растительные добавки, перед началом приема препарата Talicia. Препарат Talicia может влиять на действие других лекарственных средств, а также другие лекарственные препараты могут влиять на действие препарата Talicia. Нельзя начинать прием новых лекарственных средств во время лечения препаратом Talicia, предварительно не посоветовавшись со своим лечащим врачом.



- Не следует принимать препарат Talicia, если у вас отмечается повышенная чувствительность к какому-либо из его компонентов (омепразол, амоксициллин, рифабутин), пенициллинам, ингибиторам протонной помпы или рифамицинам.
- Не следует принимать препарат Talicia, если вы принимаете препараты, содержащие рилпивирин, делавирдин или вортиконазол.

Перед началом приема препарата Talicia сообщите своему лечащему врачу обо всех своих медицинских состояниях, включая следующие:

- Беременность или планирование беременности. Препарат Talicia может нанести вред плоду. Сообщите своему лечащему врачу, если вы планируете забеременеть или предполагаете беременность во время лечения препаратом Talicia.
- Тяжелое заболевание почек или заболевание печени.

При приеме препарата Talicia нельзя измельчать или разжевывать капсулы. Нельзя принимать препарат Talicia с алкоголем.

Немедленно позвоните своему лечащему врачу, если во время лечения препаратом Talicia у вас возникли:

- Новая сыпь или другие кожные изменения, боль в мышцах или суставах, отек любой области тела, тяжелые гриппоподобные симптомы, затруднение дыхания, лихорадка, кровь в моче, уменьшение или увеличение мочеотделения, сонливость, спутанность сознания, тошнота, рвота, постоянная боль в животе, кровавый понос или если понос продолжается после завершения лечения, увеличение массы тела или изменения зрения.

Каковы частые побочные эффекты препарата Talicia?

- Наиболее частыми побочными эффектами препарата Talicia являются диарея, головная боль, тошнота, боль в животе, сыпь, расстройство желудка, боль во рту или горле, рвота и молочница. Позвоните своему лечащему врачу, чтобы получить медицинскую консультацию по поводу побочных эффектов.
- Сообщите своему лечащему врачу, если у вас отмечается усталость, слабость, болезненность, головная боль, головокружение, депрессия, повышенная чувствительность к свету или боль при глубоком вдохе.
- Препарат Talicia может снижать эффективность пероральных и других форм гормональных противозачаточных средств. Во время лечения препаратом Talicia вы должны использовать дополнительный негормональный высокоэффективный метод контрацепции.
- Во время приема препарата Talicia у вас может отмечаться коричнево-оранжевый цвет мочи или слез.

Информация, представленная здесь, не является исчерпывающей. Обратитесь к своему лечащему врачу за более подробной информацией. Посетите сайт www.talicia.com для получения информации по назначению препарата.

Настоятельно рекомендуем сообщать о побочных эффектах в FDA по телефону 1-800-FDA-1088 или по адресу www.fda.gov/medwatch